



(欢迎扫码关注“卫生职
称资讯中心”公众号)

2020 年主管护师考试 100 个知识点汇总

1. 肺癌的肺外表现有哪些？

由于肺癌所产生的某些特殊活性物质（包括激素、抗原、酶等），出现一种或多种肺外症状，以肺源性骨关节增生症较多见，还包括与肿瘤有关的异位激素分泌综合征，可出现库欣综合征、肌无力、神经肌肉疼痛等。

2. 脓性指头炎出现跳痛、肿胀时应如何处理？

及早在末节患指侧面切开。

3. 颅内压增高患者死亡的主要原因是什么？

脑疝。

4. 面部“危险三角区”疔的危险是什么？

易引起颅内海绵状静脉窦炎。

5. 护理肿瘤放疗患者，应每周检查一次白细和血小板，当白细胞降至多少应暂停治疗？





白细胞小于 $3 \times 10^9 /L$ ，血小板小于 $50 \times 10^9 /L$ 时应暂停放行。

6. 骨软骨瘤好发于何处？

长骨的干骺端。

7. 微循环衰竭期表现如何？

血液处于高凝状态。

8. 轻度 CO 中毒时，患者全血的碳氧血红蛋白浓度是多少？

10%~20%

9. 热射病“三联征”是指什么？

高热、无汗、意识障碍。

10. 再生障碍性贫血属于何病？

造血干细胞疾病

1. 急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病患者脑脊液的典型改变是什么？

蛋白-细胞分离现象。

2. 洗胃液一般每次注入的量是多少？

200~300ml

3. 各类休克共同的病理生理改变如何？





有效循环血量锐减。

4. 中枢性瘫痪最常见的类型是哪些?

痉挛型脑瘫, 占 50%~60%, 主要因锥体系受累引起。

5 心脏复苏的首选药物是什么?

肾上腺素

6. 休克时反映器官血流灌注最重要的指标是什么?

尿量。

7. 心肺复苏心脏按压应该使胸骨下陷至少多少?

5cm

8. 中枢神经系统活动能量的来源是什么?

碳水化合物。

9. 化疗不良反应中最常见、最严重的是什么?

骨髓抑制。

10. 同质移植是指什么?

同卵双生同胞之间的移植。因为遗传因素, 同质移植一般不发生排斥。

1. 脑挫伤的特点如何?





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

脑组织受到破坏较轻，软脑膜尚完整。

2. 感染性休克首先输入的液体是哪种？

平衡盐溶液。

3. 治疗休克最基本的措施是什么？

补充血容量。

4. 哪种休克单独使用血管收缩药效果好？

过敏性休克。

5. 脑裂伤的特点如何？

软脑膜被破坏。

6. 急性颅内压升高有脑疝先兆时如何紧急处理？

首先使用 20%甘露醇快速静脉注射脱水，减低颅内压。

7. 休克患者 IC 的监测指标有哪些？

- ①血小板计数低于 $80 \times 10^9 / L$
- ②凝血酶原时间比对照组延长 3 秒以上
- ③血浆纤维蛋白原低于 $1.5 g/L$ 或呈进行性降低

8. 成年人颅内压增高是指颅内压持续高于多少？





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

200mmH₂O

9. 急性呼吸窘迫综合征最基本的病理改变是什么?

低氧血症。

10. 表浅化脓性感染化脓以后采取什么治疗措施?

手术切开引流的方式治疗。

1. 气管内吸痰时，每次插管吸痰时间不宜超过多少?

15 秒。

2. 癫痫大发作的特征如何?

意识丧失和全身抽搐。

3. 临床上最常见的水钠代谢紊乱是哪种?

等渗性脱水。

4. 急性有机磷中毒多在中毒后 24~96 小时突然死亡，称为什么?

中间综合征

5. 压头试验阳性体征见于何病?

神经根型颈椎病。

6. 急性 CO 中毒时，给予吸氧的浓度是多少?





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

8~10L/min, 严重者应给予高压氧治疗。

7. 高钾血症患者典型的心电图表现如何?

T 波高尖。

8. 垂体功能检查包括哪些?

FSH、LH 放射免疫测定、垂体兴奋试验、影像学检查等。

9. 表浅化脓性感染化脓前采取什么治疗措施?

非手术治疗。

10. 中心静脉压 (CVP) 是指什么?

上、下腔静脉进入右心房处的压力, 通过上、下腔静脉或右心房内置管测得, 它反映右房压, 是临床观察血流动力学的主要指标之一, 正常值为 5~12cmH₂O。

1. 对溺水所致呼吸心搏骤停者, 其紧急处理措施是什么?

人工呼吸和胸外心脏按压。

2. 与原发性癫痫的发生有关的因素是什么?

遗传因素。

3. 哪种疾病引起的休克其外周血管阻力将明显下降?

革兰阴性杆菌败血症。





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

4. 人体细胞内液主要的阳离子是哪种?

K⁺

5. 中度 CO 中毒时, 患者全血的碳氧血红蛋白浓度是多少?

30%~40%

6. 低钾血症最早的临床表现如何?

肌无力。

7. 为明确癫痫诊断应做的检查是哪些?

脑电图。

8. 引起心源性休克最常见的病因是什么?

急性心肌梗死。

9. 脑出血最常见的部位是何处?

内囊。

10. 外科中最常见的休克类型是哪种? 其治疗原则如何?

低血容量性休克是外科中最常见的休克类型。治疗原则是及时补充血容量, 治疗其病因和制止其继续出血、失液。

1. 上消化道大出血致失血性休克时紧急处理措施是什么?





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

首先应积极补充血容量控制休克，同时紧急止血。

2. 呼吸心搏骤停的主要直接原因是什么？

成人主要原因是冠心病，小儿主要直接原因是窒息。

3. 短暂性脑缺血发作的主要病因是什么？

动脉硬化。

4. 出现“熊猫眼征”的颅骨骨折是哪种？

颅前窝骨折。

5. 休克的基本原因是什么？

有效循环血量不足，脏器的微循环灌注不良。

6. 心搏骤停患者最重要的诊断依据是什么？

颈动脉搏动消失。

7. 由脾破裂出血引起的休克属于哪种？

低血容量性休克。

8. 同种异体移植是指什么？

人与人之间的移植。

9. 当患者出现脑疝时，不宜做的检查是什么？





腰椎穿刺。

10. 自体游离皮片移植属于哪种?

同质移植。

1. 胃癌最主要的转移途径有哪些?

淋巴道转移。

2. DIC 早期患者进行抗凝治疗首选何药?

肝素。

3. 明确癫痫病因应做的检查是哪些?

CT 和 MRI

4. 肝脾破裂出血导致低血容量性休克, 遵医嘱应快速输入哪种液体?

平衡盐溶液和人工胶体液。

5. 颅底骨折合并脑脊液漏的护理重点是什么?

预防颅内感染。

6. 对 ARDS 的诊断和病情判断有重要意义的检查是什么?

血气分析。

7. 金属音调咳嗽提示的疾病是什么?





纵隔肿瘤、主动脉瘤或支气管癌等直接压迫气管所致。

8. 人体细胞外主要的阳离子是哪种?

Na⁺

9. 多器官功能障碍中最常见的器官是何处?

肺脏。

10. 大肠癌大规模普查的初筛方法是什么?

大便隐血试验。

1. 引起气性坏疽的致病菌为哪种?

产气荚膜梭菌。

2. 诊断早期胃癌的首选方法是什么?

胃镜。

3. CO 中毒时常最先受损的部位是何处?

脑、心

4. 手术后患者的体位怎样护理?

全身麻醉尚未清醒者，取平卧位，头转向一侧，清醒后且血压平稳者，可取半卧位；椎管内麻醉者，应平卧 6~8 个小时，以防因脑脊液外漏而出现头痛；颅脑手术后可取 15°~30° 头高足低斜坡卧位；颈胸部手术后，多采用高半坐卧位；





腹部手术后，多采用低半卧位或者斜坡卧位；腹腔内有感染者，若病情许可，应尽早改为半卧位或头高足低位，以利于有效引流。

5. 胃癌最好发的部位是何处？

胃窦部。

6. 对开放性损伤进行清创术的时限，一般不得超过伤后多久？

6~8 小时。

7. 重度 CO 中毒时，患者全血的碳氧血红蛋白浓度是多少？

>50%

8. 断离肢体的现场保护方法是什么？

无菌或清洁敷料包裹后干燥冷藏。

9. 补液的基本原则是什么？

先快后慢、先晶后胶、先浓后淡、先盐后糖、见尿补钾、缺啥补啥。晶体液首选平衡盐溶液。

10. 微循环扩张期表现如何

微动脉、微静脉收缩。

1 破伤风患者在应用镇静药后集中采取护理措施的目的是什么？

减少刺激引起的抽搐。





2 适用于处理肉芽过度增生的药物是何药?

2%硝酸银。

3 急性 CO 中毒患者苏醒后, 应继续观察的时间是多久?

2 周

4 意识全部丧失, 所有反射均消失的状态称为什么?

深昏迷。

5 颅前窝骨折的临床表现是什么?

“熊猫眼征”、脑脊液鼻漏及嗅觉丧失。

6 哪一种食物中毒以神经系统症状为主要临床表现, 且病死率高?

肉毒杆菌食物中毒。

7 护士观察 CO 中毒患者的病情时, 应特别警惕的并发症是什么?

迟发性脑病。

8 单纯性甲状腺肿的原因是什么?

缺碘、致甲状腺肿物质或相关酶缺陷等原因所致的代偿性甲状腺肿大。

9 缺铁性贫血铁生化检查结果是什么?





血清铁蛋白降低、血清铁降低、总铁结合力升高、转铁蛋白饱和度降低。血清铁蛋白能反应体内贮铁量。

10 再生障碍性贫血患者并发口腔真菌感染时，宜选用何药？

碳酸氢钠液漱口

1. 风湿性关节炎主要累及的部位是何处？

周围关节。

2. 肾病综合征的并发症有哪些？

①感染：常见并发症，常发生呼吸系统、泌尿系统、皮肤感染，与蛋白丢失、免疫力降低及免疫抑制剂应用有关，是导致肾病综合征复发及疗效不佳的主因之一。

②栓塞：患者血液呈高凝状态，常见于肾静脉、下肢静脉。

③急性肾衰竭：多见于 50 岁以上的患者。

④其他：高脂血症导致动脉硬化、冠心病，大量蛋白尿导致负氮平衡和营养不良。

3. 糖皮质激素治疗肾病综合征的用药原则是什么？

起始足量、缓慢减药和长期维持。

4. 风湿性关节炎关节受累最常见的首发症状是什么？





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

关节疼痛。

5. 肾盂肾炎最常见的易感因素有哪些？

尿路梗阻、尿路畸形、机体抵抗力降低、女性。

6. 类风湿关节炎最基本的病理损害是关节的何处？

滑膜炎症。

7. 原发性肾病综合征的主要病因是什么？

免疫因素。

8. 类风湿关节炎患者进行关节功能锻炼的最佳时期是何时？

恢复期。

9. 肾盂肾炎的最常见感染途径是什么？

上行感染。

10. 为防止脑水肿，用冰槽降温时患者的肛温维持在多少？

33℃

