



(欢迎扫码关注“卫生职
称资讯中心”公众号)

2020 年主管护师考试常考考点汇总 (160 题)

- 1、 基础代谢率计算公式：脉搏+脉压-111
- 2、 心肺复苏药物给药途径首选：静脉注射
- 3、 心肺复苏首选药物：肾上腺素
- 4、 防治脑水肿，应用最广，效果较好的脱水剂是：20%甘露醇溶液
- 5、 急性阑尾炎发生的最重要的原因：阑尾管腔梗阻
- 6、 下肢静脉曲张的主要原因是：静脉瓣膜破坏
- 7、 膀胱结石的典型症状是：排尿突然中断
- 8、 最常见的疝内容物是：小肠
- 9、 急性重症胆总管炎病人梗阻原因主要是：胆管结石
- 10、 手术前应行清洁灌肠的是：结肠或直肠手术
- 11、 能预防局麻药中毒的术前用药是：苯巴比妥钠





- 12、 肛裂典型的临床表现：周期性规律疼痛
- 13、 胰头癌的主要临床特点是：黄疸
- 14、 夏柯(Charcot)三联征是：剑突下绞痛，寒战高热，黄疸
- 15、 胆石症患者出现胆绞痛时禁用：吗啡
- 16、 纠正代谢性酸中毒首选：5%碳酸氢钠
- 17、 幽门梗阻患者术前3天洗胃应用：等渗盐水
- 18、 急性阑尾炎的最常见最重要体征为：右下腹固定压痛点
- 19、 胆道蛔虫病的典型表现是：突然发作上腹部"钻顶"样疼痛
- 20、 乳癌多发生于：乳房外上象限
- 21、 胆石症取石手术后，下列哪项是拔除"T"管引流的指征：术后2周，引流量减少，造影通畅
- 22、 初期复苏的首要关键：保持呼吸道通畅
- 23、 一般情况下，颈、胸、腹部手术后采用：半坐卧位
- 24、 腹腔穿刺抽到不凝固血液，可见于：肝、脾破裂
- 25、 对确定肿瘤的诊断价值最大：活组织病理检查
- 26、 瘢痕性幽门梗阻最主要的临床表现是：呕吐大量隔夜食物





- 27、煮沸消毒时为提高沸点可在水中加入：碳酸氢钠
- 28、支气管呼吸音只见于：肺炎
- 29、通过哪项评估可判定病人需要吸痰：呼吸音
- 30、肠鸣音亢进时每分钟至少能听到：10次
- 31、白细胞分类计数，中性粒细胞(包括杆状核，分叶核)正常应占：50%--75%
- 32、成人男性血红蛋白正常参考值范围为：120-160g/L
- 33、尿蛋白定量标本瓶中的防腐剂是：甲苯 5ml
- 34、尿液呈酱油色见于：急性溶血
- 35、正常人每日无形失水量为：850ml
- 36、各种类型休克基本病理变化是：有效循环血量锐减
- 37、甲状腺危象的主要原因是：术前准备未达要求
- 38、治疗骨折最常用的方法是：手法复位与外固定
- 39、女性青春期开始的重要标志是：月经初潮
- 40、新生儿可从母体获得，但3-5个月后逐渐消失的抗体是：IgG
- 41、急性梗阻性化脓性胆管炎最关键的治疗是：紧急手术胆道减压





- 42、呼吸衰竭患者禁用：吗啡
- 43、 外周血中反映骨髓幼红细胞增生程度的首选项目是：网织红细胞百分数
- 44、 血清白蛋白显著降低最常见于：慢性肝病
- 45、 洋地黄类药物的常见心血管系统毒性反应为各种心律失常，其中最常见的是：室性期前收缩多呈二联律、三联律
- 46、 使用洋地黄类药物的绝对禁忌证是：洋地黄中毒或过量
- 47、 主动脉狭窄最有意义的体征是：主动脉瓣区闻及收缩期吹风样杂音
- 48、 与肺癌的发生关系最密切的是：吸烟
- 49、 引起心脏后负荷过重的疾病常见于：高血压
- 50、 呼吸衰竭患者导致 CO₂ 潴留机制是：肺泡通气不足
- 51、 细菌性肺炎最常见的病原菌是：肺炎球菌
- 52、 护理理论四个基本概念的核心是：人
- 53、 现代医学模式为：生物-心理-社会医学模式
- 54、 护理理论的四个基本概念：人、环境、健康、护理
- 55、 人与人交往的过程中，运用语言性沟通技巧约占：35%
- 56、 世界上第一所正式护士学校创建于：1860 年，英国





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

- 57、结核病最主要的传播途径是：飞沫
- 58、 支气管肺癌最常见的早期症状是：阵发性刺激性干咳
- 59、 二尖瓣狭窄患者最易出现的心律失常是：房颤
- 60、 慢性阻塞性肺疾病患者的标志性症状是：进行性加重的呼吸困难
- 61、 异位妊娠病人就诊的主要症状是：腹痛
- 62、 雌激素的生理功能是：提高**肌肉对缩宫素的敏感性
- 63、 诊断异位妊娠简单可靠的辅助检查是：**后穹窿穿刺
- 64、 妊娠高血压疾病的基本病理变化是：全身小动脉痉挛
- 65、 老年性**炎进行**灌洗常用的药液是：1%乳酸
- 66、 正常的胎心音为：120~160 次/分
- 67、 在妇科常用特殊检查中，防癌普查最常用的检查方法是：宫颈刮片检查
- 68、 确定进入第二产程最重要的表现是：肛查：宫口开全
- 69、 最容易发生嵌顿的腹外疝是：股疝
- 70、 最常见的腹外疝是：腹股沟斜疝
- 71、 原因未明的急性中毒洗胃选用：清水





- 72、 有机磷农药所致急性肺水肿用：阿托品
- 73、 氰化物中毒用：硫代硫酸钠
- 74、 关节脱位的特征性表现是：弹性固定
- 75、 高位小肠梗阻除腹痛外最主要症状是：呕吐频繁
- 76、 在独生子女中引起畏食的常见原因是：精神因素
- 77、 鹅口疮常用清洗口腔的药液是：2%碳酸氢钠溶液
- 78、 新生儿颅内出血典型症状是：先表现兴奋后出现抑制
- 79、 佝偻病发病的主要原因是：缺乏维生素 D
- 80、 胃大部切除术后：半卧位
- 81、 慢阻肺病人痰液黏稠，多饮水是为了：促进痰液稀释而容易排出
- 82、 急性白血病化疗病人多饮水的目的是：防止尿酸性肾病
- 83、 肾盂肾炎病人多饮水可以加速细菌、毒素及炎性分泌物排出
- 84、 甲状腺功能亢进症病人多饮水能：补充出汗等所丢失的水分
- 85、 急性胸膜炎病人常取：患侧卧位
- 86、 口服毒物患者在洗胃时，每次洗胃液体量为：200-300ml





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

- 87、 胃癌易向下列何处淋巴结转移：左锁骨上淋巴结
- 88、 机体调节酸碱平衡最迅速的一条途径是：血液缓冲系统
- 89、 对乳癌术后出院病人健康指导，哪项最重要：五年内避免妊娠
- 90、 乳癌病变发展过程中最易受染的是：腋窝淋巴结
- 91、 乳癌病变发展过程中最易受染的是：腋窝淋巴结
- 92、 确定给氧浓度的首要指标为：病情和血气检查
- 93、 病人痰液有恶臭味，判定为何种细菌感染：厌氧菌
- 94、 急性心肌梗塞时，何种血清酶升高最早，恢复最快：Cpk
- 95、 洋地黄中毒所导致完全性房室传导阻滞禁用：氯化钾
- 96、 胃酸分泌增多最明显的疾病是：十二指肠溃疡
- 97、 尿中出现多量管型，说明病变部位在：肾实质
- 98、 急性重症胆管炎病人的治疗原则是：抗休克+胆总管切开引流
- 99、 对原发性肝癌，早期诊断最有意义的是：A-f
- 100、 治疗腹股沟疝最常用的方法是：疝修补术
- 101、 甲状腺手术后突然导致呼吸困难和窒息的最常见原因是：切口内出血形成血肿





- 102、 恶性肿瘤 tnm 分期法中 m 表示：远处转移
- 103、 **内有大量泡沫状，灰黄色，质稀薄伴腥臭味的白带最常见于：滴虫性**炎
- 104、 葡萄胎病人清宫术后最佳的避孕方法：**套或**隔膜
- 105、 正常产褥期为产后：6 周
- 106、 胎儿娩出后首先的处理是：清理呼吸道
- 107、 绒毛膜癌最常见的转移部位是：肺
- 108、 开始给小儿添加鱼肝油的时间应为：出生后 2-4 周
- 109、 新生儿呼吸窘迫综合征的主要体征是：出生后进行性呼吸困难、发绀
- 110、 新生儿破伤风典型的临床症状是：牙关紧闭，苦笑面容
- 111、 婴幼儿易患呼吸道及胃肠道感染是因为：sigA
- 112、 肾结核者出现：脓尿
- 113、 膀胱癌者出现：无痛血尿
- 114、 急性胆囊炎时：疼痛向右肩部放射
- 115、 输尿管结石者：疼痛向会**放射
- 116、 先兆流产：宫颈口未开，**大小与孕周相符，胎膜未破，妊娠





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

- 117、难免流产：宫颈口扩张，常有胚胎组织堵塞宫颈口内，**大小
- 118、不全流产：宫颈口扩张，**小于孕周，为
- 119、完全流产：宫颈口关闭，**接近正常大小，为
- 120、按新九分法计算双上肢体表面积是：18%
- 121、急性肾盂肾炎病人最常见的是：尿白细胞 >5 个/HP.
- 122、系统性红斑狼疮病人较常见：关节与肌肉疼痛
- 123、肺癌最常见的早期症状是：刺激性呛咳.
- 124、肝硬化病人不宜大量放腹水，因可导致：肝性脑病
- 125、有幽门梗阻者行胃镜检查前 2~3 天应给予：流食
- 126、缺氧的典型表现是：发绀
- 127、系统性红斑狼疮最常见的死亡原因是：尿毒症
- 128、护理慢性肾功能衰竭，最重要的是：每日记出入液量
- 129、急性肾盂肾炎最重要的护理措施是：多饮水
- 130、心绞痛发作的首要护理措施是：让病人安静坐下或半卧
- 131、有机磷农药中毒原理是：使乙酰胆碱在体内蓄积





- 132、原发性高血压最常见的死亡原因是：脑血管意外
- 133、可判断类风湿性关节炎活动度指标的是：晨僵
- 134、某缺铁性贫血病人，需口服硫酸亚铁，指导服用方法应：饭后服用
- 135、肢体可脱离床面，但不能抵抗阻力，此时的肌力为：3级
- 136、风湿性疾病多系统损害中发生率最高的是：关节
- 137、肝硬化导致门脉高压的表现有：腹水
- 138、肝癌早期的诊断方法是：甲胎蛋白测定
- 139、急性白血病患者突然出现高热，主要原因为：感染
- 140、降糖作用最强的药物是：优降糖
- 141、腹部触诊有揉面感可见于：结核性腹膜炎
- 142、支气管呼吸音只见于：肺炎
- 143、严重呕血病人应暂禁食：8-24h
- 144、急性胸膜炎病人常取：患侧卧位
- 145、心力衰竭最常见的诱发因素是：感染
- 146、左心功能不全最早出现的呼吸困难是：劳力性呼吸困难





- 147、 应付压力引起的情感变化首先是：精神发泄，以示防卫
- 148、 张某，车祸全身多处骨折，需急送医院，搬运时宜用：四人搬运法
- 149、 在为病人大量输入库存血后易导致出血倾向的发病机制是：血中血小板破坏
- 150、 肌内注射可选择：大腿中段外侧
- 151、 护理诊断 PSE 公式中的 P 代表：病人的健康问题
- 152、 护士王某因上班时与同事发生矛盾，回家后向家人发脾气，此行为属于哪一种心理防卫：转移
- 153、 强酸、强碱中毒最适合用哪种物质作保护剂：蛋清
- 154、 按医疗技术水平划分可将医院分为：一、二、三级医院
- 155、 0.1ml 破伤风抗毒素过敏试验液含破伤风抗毒素：1500 国际单位
- 26、 因疾病长期俯卧位的卧床病人，压疮最易发生在：额部
- 157、 在护理肝硬化严重腹水的病人时，其饮食应注意给予：无盐低钠饮食
- 158、 尿查 17-羟类固醇标本中需使用浓盐酸防腐剂是因为：防止尿中激素被氧化
- 159、 肝硬化病人意识不清，不能选用肥皂水灌肠的原因是：肥皂水灌肠可使氨的产生和吸收增加





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

160、胆管阻塞的病人大便颜色呈：陶土色



扫二维码下载 **环球网校移动课堂 APP**

移动学习 职达未来