



微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒



(欢迎扫码关注执业药师考试  
资讯公众号)

## 2020 年执业药师《中药综》考点新增：中药注射剂的合理应用

合理应用 基本原则	能口服给药的，不选用注射给药；能肌内注射给药的，不选用给药；口服>注射，肌内注射>静脉注射或滴注
	临床使用应辨证用药，严格按照药品说明书规定的功能主治使用，禁止超功能主治用药
	不超剂量、不过快滴注和不长期连续用药
	中药注射剂应单独使用，禁忌与其他药品混合配伍使用。如确需联合使用其他药品时，应谨慎考虑与中药注射剂的间隔时间以及药物相互作用
	用药前应仔细询问过敏史，对过敏体质者应慎用
	特殊人群和初次使用的患者应慎重使用。长期使用每疗程间要有一定的时间间隔
	密切观察用药反应，特别是开始 30 分钟。发现异常立即停药，采用积极救治措施
不合理使用 用例举	患者证属痰浊蒙蔽兼有瘀血之胸痹，用生脉注射液则助温生痰，致症状加重，宜使用复方丹参注射液活血化瘀
	鱼腥草注射液性凉，适用于热证，但不适于寒性病证
	川芎嗪注射液对于心血瘀阻型的心脑血管疾病疗效更佳
	无体虚的患者使用补益类如参麦、黄芪等注射液则会出现心悸、眩晕、血压升高等不良反应
超功能主治用药	穿琥宁注射液用于病毒性肺炎、病毒性上呼吸道感染，不能治疗细菌性感染如扁桃体炎
给药途径或方	野木瓜注射液给药途径和方式为“肌内注射”，作腰椎束旁痛点封闭注射时可能造





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

式不当	成胸闷、心悸、全身麻木等不良反应
超剂量使用	注射用丹参多酚酸盐的药品说明书，其单次用量为 200mg，用量过大则易造成不良反应
溶媒选用不当	参麦注射液一次 20~100ml，用 5%葡萄糖注射液 250~500ml 稀释后应用，与 0.9%的氯化钠注射液配伍后可能产生大量的不溶性微粒，增加不良反应的发生
溶媒用量不足 或药物浓度过高	艾迪注射液应使用 0.9%氯化钠注射液或 5%~10%葡萄糖注射液 400~450ml 配制稀释溶剂 临床给药过程中药品浓度过大或给药速度过快，均可能导致头晕、疼痛、刺激性皮炎等不良反应
配伍禁忌	清开灵注射液不能与硫酸庆大霉素、青霉素 G 钾、肾上腺素、间羟胺、乳糖酸红霉素、多巴胺、山梗菜碱、硫酸美芬丁胺等药物配伍使用 复方丹参注射液与氧氟沙星、环丙沙星、甲磺酸培氟沙星、诺氟沙星等喹诺酮类药物配伍时，立即出现浑浊，有时有絮状沉淀，有时析出结晶等 复方丹参注射液加入人低分子葡萄糖酐注射液中静脉滴注，较易引起过敏反应
配制不规范	黄芪注射液宜用 5%~10%葡萄糖注射液稀释后使用，不宜在同一容器中与其他药物混用
中药注射剂应单独使用，禁忌与其他药品混合配伍使用	
双黄连等粉针剂，需首先用灭菌注射用水溶解后再用适宜溶媒稀释使用	

