



微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒



(欢迎关注执业药师考试
资讯公众号)

2020 年执业药师《药学综合知识与技能》100 个核心考点

1. 哺乳期妇女禁用的药品是环丙沙星
2. 肝病者慎用的药品是甲氨蝶呤
3. 关于新生儿用药特点叙述正确的是?新生儿体表面积与体重之比较成人大
4. 反映国内外医学重大新闻、最新进展和科研动态的网站是?中国医学论坛报网
5. 保管中最易受潮变质的常用药品是多酶片
6. 下列关于循证医学的叙述错误的是循证医学不包括医师或药师长期积累的临床诊疗经验
7. 调剂处方时, 必须做到“四查十对”, “四查”是查处方、查药品、查配伍禁忌、查用药合理性
8. 患者男, 65 岁, 患 2 型糖尿病 12 年, 3 日前来诊, 血压 156/98mmHg, 体重指数 20, 颜面及双下肢轻度可凹性水肿, 检查尿蛋白++, 血清肌酐 $130 \mu\text{mol/L}$. 对其宜选用的药品是格列喹酮+福新普利
9. 老年人应避免使用的药物中能产生多种毒性及 Q-T 间期延长的是胺碘酮
10. 结核患者同时服用异烟肼和利福平治疗期间应监测肝功能
11. 有关胆碱酯酶复活剂应用的叙述, 正确的是复活剂对解除烟碱性样作用较强
12. 由国内各学科医药学权威专家, 根据临床用药经验并结合国内外公认的资料编写的三级文献是?中国药典临床用药须知
13. 维生素 B2 的特定吸收部位在小肠上部, 故其最适宜服用的时间是餐后



扫二维码下载 环球网校移动课堂 APP

移动学习 职达未来



微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

14. 服用期间同时饮酒会降低抑制尿酸生成效果的药品是别嘌醇
15. 配制 75%乙醇 2000ml, 应取 95%的乙醇约 1579ml
16. 最可能引起血小板计数减少的抗生素是甲磺霉素
17. 患者男, 74 岁, 服药后出现血清 γ -谷氨酰转移酶升高, 最可能造成此不良反应的药物是苯妥英钠
18. 可缓解鼻黏膜肿胀的肾上腺素 α 受体激动剂禁用于闭角型青光眼
19. 可导致再生障碍性贫血的药物是甲氨蝶呤
20. 文献中, 属于一级文献的是中国药学杂志
21. 患者男, 70 岁, 患高血压病 10 年, 2 周来反复出现活动后胸疼。检查: 血压 170/100mmHg, 心率 90 次/分, 律齐, 血钾偏高。心电图正常, 血管彩超提示双侧颈动脉斑块和双侧肾动脉狭窄。最适宜的联合用药方案是?CCB+ β -受体阻断剂+噻嗪类利尿剂患者女, 58 岁, 诊断为轻度骨质疏松症, 伴有乳腺小叶增生症。下列措施中不宜选用的是?降钙素治疗
22. 驾驶员如需使用抗过敏药时, 宜选用氯雷他定
23. 阿托品用量过大所致的谵妄、幻觉、心率过快和昏迷, 可选用的解救药品是毛果芸香碱
24. 上市后药品临床再评价阶段中, 常见病的试验样本数应不少于 2000 例
25. 增加患者出现高血糖或低血糖症隐患的药品是加替沙星
26. 静脉滴注两性霉素 B50mg 时, 滴注时间应当控制在 6h 以上
27. 由于老年人胃肠功能变化, 而导致按主动吸收方式吸收减少的药品是维生素 B1





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

28. 运动员参赛时非禁用的药品是钙通道阻滞剂
29. 阿米替林中毒导致的心力衰竭可以选用的药物是毛花丙苷
30. 灭鼠药磷化锌、磷化铝、磷化钙中毒解救时，禁用的药品是阿扑吗啡
31. 可导致心脏停搏，切忌直接静脉推注的药品是氯化钾
32. 《中华人民共和国药典》收录的处方属于法定处方
33. 导致嗜酸性粒细胞计数增多的药品是头孢呋辛
34. 哺乳期妇女禁用的药品是尼美舒利
35. 1U 维生素 A 相当于视黄醇当量 REO. 344 μ g
36. 患者男，68 岁，既往有高血压，双侧肾动脉狭窄，因水肿复诊，检查和实验室检查，血压 172/96mmHg，尿蛋白大于 2g/24h 正常值 $<150\text{mg}/24\text{h}$ ，血尿酸 416 $\mu\text{mol}/\text{L}$ 正常值 180—440 $\mu\text{mol}/\text{L}$ ，血钾 6.1mmol/L 3.5—5.5 $\mu\text{mol}/\text{L}$ ，在已经服用氨氯地平的基础上，应考虑联合应用的抗高血压药是呋塞米
37. 新药临床评价中 2 期临床试验的对象主要病种试验例数至少选用 100 例
38. 药物分类中不属于兴奋剂的是非甾体抗炎药
39. 可保护药品免受破坏从而提高疗效的联合用药是阿莫西林+克拉维酸钾
40. 可由于血浆蛋白结合置换作用而易引起危险的联合用药是阿司匹林+甲苯磺丁脲
41. 作用不同的靶位，产生协同作用的联合用药是磺胺甲恶唑+甲氧苄啶





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

42. 促进吸收，增加疗效的联合用药是硫酸亚铁+维生素 C
43. 增加毒性或药品不良反应的联合用药是氢溴酸山莨菪碱+盐酸哌替啶
44. 普通感冒患者应用抗病毒药+抗生素属于无适应症用药
45. 肌注黄体酮用于排出输尿管结石属于无正当理由超适应症用药
46. 麻黄碱用于良性前列腺增生患者属于有禁忌症用药
47. 细菌感染性腹泻给予小檗碱片+地芬诺酯片或洛哌丁胺不合理联合用药
48. 服用脂溶性维生素时适当多食脂肪
49. 应用头孢哌酮时不饮酒
50. 应用阿米卡星时不吸烟
51. 应用阿米卡星时少食醋
52. 应用尼索地平时不饮葡萄柚汁
53. 应用洛伐他汀时不饮葡萄柚汁
54. 含漱剂使用后不宜马上饮水
55. 缓、控释制剂应整片吞服，严禁嚼碎
56. 透皮贴剂禁用于红肿部位
57. 泡腾片剂严禁直接口服





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

58. 宜于清晨服用的药品是呋塞米
59. 宜于餐前服用的药品是甲氧氯普胺
60. 宜于餐后服用的药品是阿司匹林
61. 宜于睡前服用的药品是普伐他汀
62. 对过敏性结膜炎宜选用的滴眼剂是色甘酸钠
63. 对流行性结膜炎宜选用的滴眼剂是碘苷
64. 含有格列苯脲成分的中药是消渴丸
65. 含有氢氯噻嗪成分的中药是脉君安片
66. 含有氯苯那敏成分的中药是维 C 银翘片
67. 含有洛伐他汀成分的中药是血脂康胶囊
68. 含有吡哌美辛成分的中药是新癍片
69. 服用抗痛风药别嘌醇时宜多喝水
70. 服用抗贫血药硫酸亚铁时忌喝茶
71. 服用治疗痤疮的药物维 A 酸时宜多食脂肪餐
72. 服用糖皮质激素时宜多吃蛋白质
73. 服用治疗震颤麻痹药左旋多巴时宜少吃蛋白质





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

74. 对由抗癫痫药所致的骨质疏松者宜选用维生素 D
75. 对老年性骨质疏松者宜选用钙制剂+维生素 D+双磷酸盐
76. 对妇女绝经后骨质疏松合并更年期症状者宜选用钙制剂+维生素 D+雌激素
77. 对骨质疏松伴骨折引起的慢性疼痛者宜选用降钙素
78. 服用卡托普利可能引起血钾升高
79. 服用呋塞米可能引起血钾降低
80. 服用利血平可能引起心动过缓
81. 服用螺内酯可能引起血钾升高
82. 服用氨氯地平可能引起面部潮红
83. 服用维拉帕米可能引起房室传导阻滞
84. 在配制静脉输液时, 不宜直接用葡萄糖注射液溶解的药品是青霉素
85. 在配制静脉输液时, 不宜直接或间接用氯化钠注射液溶解的药品是两性霉素 B
86. 可使亚胺培南免受肾肽酶破坏的药品是西司他丁
87. 可延缓疟原虫对青蒿素耐药性的药品是磺胺多辛
88. 可抑制乙醛脱氢酶活性, 干扰乙醇代谢的药品是头孢哌酮
89. 可与茶叶中鞣酸结合, 影响自身抗菌活性的药品是米诺环素





微信扫码刷题



免费约直播领资料



免费订阅考试提醒

90. 食醋可使药物溶解度降低、析出结晶对尿路产生刺激性的药品是磺胺甲恶唑/甲氧苄啶
91. 功能性消化不良的患者宜选用奥美拉唑
92. 偶然性消化不良的患者宜选用乳酶生
93. 细菌感染的急性结膜炎患者宜选用的是利福平滴眼剂
94. 流行性结膜炎患者宜选用的处方药是碘苷滴眼剂
95. 慢性沙眼患者不宜选用的是色甘酸钠滴眼剂
96. 春季卡他性结膜炎患者宜选用非处方药是可的松眼药水
97. 属于超短效胰岛素的是门冬胰岛素
98. 属于短效胰岛素的是普通胰岛素
99. 属于中效胰岛素的是低精蛋白锌胰岛素
100. 属于超长效胰岛素的是甘精胰岛素

