



2021 年执业药师《药学专业知识二》章节模拟试题及答案

第一章 精神与中枢神经系统疾病用药

最佳选择题

1.[单选题]适应证为仅用于治疗失眠的药物是()。

- A. 地西洋
- B. 佐匹克隆
- C. 卡马西平
- D. 氟西汀
- E. 吗啡

[答案]B

2.[单选题]关于唑吡坦作用特点的说法,错误的是()。

- A. 唑吡坦属于 γ -氨基丁酸 A 型受体激动剂
- B. 唑吡坦具有镇静催眠和抗焦虑作用
- C. 口服唑吡坦后消化道吸收迅速
- D. 唑吡坦血浆蛋白结合率高
- E. 唑吡坦经肝代谢、肾排泄

[答案]B





3.[单选题]以下药物相互作用叙述错误的是()。

- A. 水合氯醛与阿米替林合用可增加心脏毒性
- B. 水合氯醛与乙醇合用可使镇静作用增强
- C. 氟伏沙明会明显升高雷美替胺的血清浓度
- D. 环丙沙星可能增加雷美替胺毒性风险
- E. 利福平可能增强雷美替胺的疗效

[答案]E

4.[单选题]佐匹克隆的作用特点不包括()。

- A. 口服迅速吸收
- B. 生物利用度约为 80%
- C. 血浆蛋白结合率低
- D. 重复给药无蓄积作用
- E. 主要经过肝脏排泄

[答案]E

5.[单选题]地西洋与下列哪种药物合用不会增加成瘾性()。

- A. 苯巴比妥
- B. 吗啡





C. 佐匹克隆

D. 咖啡因

E. 卡马西平

[答案]E

6.[单选题]唑吡坦的药理作用包括()。

A. 镇静催眠

B. 抗焦虑

C. 肌肉松弛

D. 抗惊厥

E. 抗抑郁

[答案]A

7.[单选题]服用地西洋后病情不会加重的是()。

A. 重症肌无力

B. COPD

C. 抑郁症

D. 高血压

E. 闭角型青光眼





[答案]D

8[. 单选题]唑吡坦的适应证是()。

- A. 偶发失眠和暂时失眠患者
- B. 焦虑型失眠
- C. 忧郁型失眠
- D. 老年失眠
- E. 精神紧张和疼痛所致失眠

[答案]A

9[. 单选题]苯妥英钠的不良反应与血浆药物浓度密切相关,当血浆浓度超过多少时会出现嗜睡、昏迷等不良反应()。

- A. $5 \mu\text{g/ml}$
- B. $10 \mu\text{g/ml}$
- C. $20 \mu\text{g/ml}$
- D. $30 \mu\text{g/ml}$
- E. $40 \mu\text{g/ml}$

[答案]E

配伍选择题





1[. 共享答案题]

- A. 地西洋
- B. 非苯二氮草类药物
- C. 苯二氮草类药物
- D. 氟西浮
- E. 扎来普隆

1[1 单选题]对入睡困难者首选的非苯二氮草类药物是()。

[答案]E

2[1 单选题]对焦虑型、夜间醒来次数较多或早醒者可选用的苯二氮草类镇静催眠药是()。

[答案]D

3[1 单选题]原发性失眠首选的镇静催眠药种类为()。

[答案]B

[解析]本题考查镇静催眠药的临床用药评价。对焦虑型、夜间醒来次数较多或早醒者可选用氟西浮。地西洋目前临床不常用于治疗失眠。原发性失眠首选非苯二氮草类药物，为改善起始睡眠(难以入睡)和维持睡眠质量(夜间觉醒或早间觉醒过早)，可选服唑吡坦、佐匹克隆。对入睡困难者首选扎来普隆，该药起效快，保持近似生理睡眠，醒后无不适感，但扎来普隆不适合长期使用。

2[. 共享答案题]

- A. 巴比妥类





- B. 乙内酰胺类
- C. 苯二氮草类
- D. 二苯并氮草类
- E. 脂肪酸衍生物

4[1 单选题]卡马西平属于哪类抗癫痫药物()。

[答案]D

5[1 单选题]苯妥英钠属于哪类抗癫痫药物()。

[答案]B

综合分析选择题

1[. 共享题干题]患者，男，20岁。癫痫病史10年，持续抽搐伴神志不清4小时入院。抽搐时神志不清，双眼上吊，口吐白沫，咬破舌头，四肢强直、阵挛，小便失禁，持续5~10分钟后自行缓解，每年发作十几次。4小时前劳累后频繁抽搐，神志不清。

1[1 单选题]为该患者行心电图检查，发现患者有II度房室传导阻滞，以下哪种药物不得用于治疗()。

- A. 苯妥英钠
- B. 丙戊酸钠
- C. 托吡西甘
- D. 左乙拉西坦
- E. 卡马西平





[答案]A

2[1 单选题]该患者拟学习驾驶汽车,考取驾驶证,药师的建议不应该包括()。

- A. 若癫痫已有一年无发作可以参加学习
- B. 若已确定癫痫在 3 年中只在睡眠时发作而无觉醒发作可以参加学习
- C. 患者绝不可驾大货车或大轿车等车辆及运营车辆
- D. 患者不要在撤用抗癫痫药物期间开车,而应于撤药后 3 个月再驾车
- E. 若出现晕厥,不应驾驶或操作机械

[答案]D

3[1 单选题]以下药物不能立刻换用或加用的是()。

- A. 吗氯贝胺
- B. 舍曲林
- C. 西酞普兰
- D. 艾司西酞普兰
- E. 帕罗西汀

[答案]A

4[1 单选题](假设)患者回家服用氟西汀 20mg/d, 3 日后,家人见症状无明显改善,自行将剂量增至 60mg/d,患者可能出现的症状不包括()。





- A. 嗜睡
- B. 焦虑
- C. 肌无力
- D. 躁狂
- E. 锥体外系反应

[答案]C

5[1 单选题]患者及家属在确认氟西汀 20mg/d 疗效欠佳时,应在医生的指导下,经过多长时间将药量逐渐加量()。

- A. 1~2 周
- B. 3~4 周
- C. 5~6 周
- D. 7~8 周
- E. 10 周

[答案]B

多项选择题

1[. 多选题]中枢镇静催眠药包括()。

- A. 苯二氮草类





- B. 巴比妥类
- C. 醛类
- D. 环吡咯酮类
- E. 褪黑素

[答案]ABCDE

2[多选题]关于抗抑郁药的使用注意事项,正确的有()。

- A. 选择抗抑郁药物时需考虑患者的症状特点、年龄、药物的耐受性、有无合并症的因素
- B. 大多数抗抑郁药起效缓慢,需4~6周方能见效
- C. 在足量足疗程治疗无效的情况下,可考虑更换另一种作用机制不同的抗抑郁药
- D. 抗抑郁药需从小剂量开始并逐渐增加剂量,且尽可能采用最小有效剂量维持
- E. 单胺氧化酶抑制剂可与5-羟色胺再摄取抑制剂联合治疗抑郁症

[答案]ABCD

3[多选题]与苯妥英钠合用,可使以下药物疗效降低的有()。

- A. 环孢素
- B. 左旋多巴
- C. 糖皮质激素
- D. 含雌激素的口服避孕药





E. 促皮质激素

[答案]ABCDE

4.[多选题]多奈哌齐常见的不良反应包括()。

- A. 锥体外反应
- B. 房室传导阻滞
- C. 幻觉
- D. 易激怒
- E. 失眠

[答案]CDE

5.[多选题]以下药物与单胺氧化酶抑制剂合用可引起严重不良反应的是()。

- A. 氯米帕明
- B. 马普替林
- C. 吗啡
- D. 氟西汀
- E. 米氮平

[答案]ABCDE

